

► Bioestimulante a partir de Quitina.



Bioproducto único compuesto principalmente por quitina, producido mediante un proceso biotecnológico orgánico que impulsa el rendimiento de tus cultivos que a su vez optimiza los resultados y mejora el suelo para actuales y futuras cosechas.

En el suelo la quitina de GreenFort Chitin® es un potente nutriente vegetal natural que mejora la microbiota del suelo resultando en una simbiosis entre planta-microorganismos y promoviendo el crecimiento radicular, la absorción de nutrientes, lo que promueve el rendimiento de los cultivos.

Mecanismo de acción:

- El ingrediente principal de GreenFort Chitin® es la Quitina.
- La quitina es un polisacárido que promueve el crecimiento de microorganismos benéficos.
- Estos microorganismos modifican favorablemente las condiciones del suelo; promoviendo el crecimiento de los cultivos.
- Promueve naturalmente el rendimiento dando mejores cosechas.

Beneficios:

- ✓ Mejora el crecimiento de microorganismos benéficos
- ✓ Promueve una microbiota del suelo sana
- ✓ Mejora el rendimiento de los cultivos

Compatibilidad:

Se puede aplicar a todos los cultivos. Se puede mezclar con la gran mayoría de fertilizantes, insecticidas, herbicidas reguladores de crecimiento y fungicidas.

Se puede aplicar a todo tipo de suelos y rangos de pH.

*Se recomienda hacer prueba de compatibilidad.

Composición:

Composición química	%(P/P)	Composición química	%(P/P)
Quitina	26,5%	Calcio (Ca)	16%
Materia Orgánica	35,9%	Magnesio (Mg)	0,7%
Nitrógeno Total (N)	3,4%	Azufre (S)	0,9%
Fósforo (P ₂ O ₅)	10%	Hierro (Fe)	584,9ppm
Potasio (K ₂ O)	0,21%		

Instrucciones de uso:

Para alcanzar resultados de mayor calidad se debe agregar a su régimen regular de fertilización, con una fuente de NPK efectiva. GreenFort Chitin® se tamiza a 200 mesh.

Cultivo	Dosis kg/ha/aplicación	Momento de aplicación
Solanáceas (Tomate, papa, chile, tabaco, berenjena, tomate de cáscara...)	1 - 2	Se recomienda realizar 3 aplicaciones con intervalo de 15 días. Realizar la primera aplicación 7 días después del trasplante o 15 días después de la siembra.
Curcubitáceas (Pepino, calabacita, melón, sandía)		
Brasicáceas (Kale, brócoli, coliflor, rábano...)		
Amarilidáceas (Ajo, cebolla...)		
Especias (Orégano, menta...)		
Ornamentales (Claveles, dalias, nochebuenas, tulipanes...)		
Otros (Espárragos, apio, lechuga)		
Berries (Fresa, frambuesa, arándano)	1 - 2	Se recomienda realizar 3 aplicaciones con intervalo de 15 días. Realizar la primera aplicación 7 días después del trasplante o 15 días después de la siembra. En cultivos establecidos, realizar la primera aplicación al inicio de la brotación.
Frutales (Aguacate, limón, naranjo, manzana, mango, papaya, piña, platanero, peral, dátil, toronja, higuera, pistache, almendra, macadamia, nogal)		
Bid		
Agave		
Café		
Cacao		
Forestales		