

Si Absorb SL®

► Inductor de resistencia



Fertilizante líquido concentrado soluble en agua que contiene silicio (Si) en una forma altamente asimilable por las plantas y micronutrientes. Destinado a aplicación foliar en: Frutales, vegetales, ornamentales, maíz y arroz.

Modo de acción:

Si Absord®SL se usa especialmente para fortalecer las plantas durante los períodos de estrés generados por sequía ó calor; para mejorar el tamaño y la firmeza de los frutos, para reducir el agrietamiento y golpe de sol en los frutos, y ayuda a mejorar los rendimientos de los cultivos, debido a su contenido de silicio y sus ingredientes específicos.

Reduce eficazmente la incidencia de muchos trastornos fisiológicos de las plantas y aumenta significativamente el contenido de polifenoles, antioxidantes antruales de las plantas tratadas y, por lo tanto, mejora sus propiedades nutricionales.

Composición:

Boro(B)0,3% (ácido bórico)

- No. CAS:10043-35-3

Cobre(Cu) 1,0%(Cloruro de cobre)

- No.CAS:10125-13-0

Molibdeno(Mo)0,2%(Molibdato de sodio)

- No.CAS:10102-40-6

Zinc(Zn)0,6%(Cloruro de Zinc)

- No.CAS:7646-85-7

Silicio(Si)0,73%p/p(2,5%p/p como ácido ostosilícico)

- No.CAS:10193-36-9

Dosificación:

Cultivo	Dosis y aplicación
Frutales	Realizar aplicación foliar de 1 cc/L de agua, siguiendo la calibración del equipo. Realizar de 3 a 5 aplicaciones seguidas con un intervalo de aplicación de 10 a 14 días, se recomienda realizar la primera aplicación después de la floración.
Vegetales	Realizar aplicación foliar de 200 mL de Si Absord SL en 200 L de agua, siguiendo la calibración del equipo, con un intervalo de aplicación de 7 a 10 días, realizando de 3 a 5 aplicaciones seguidas.
Ornamentales	Realizar aplicación foliar de 100 mL de Si Absord SL en 100 L de agua con un intervalo de aplicación de 7 a 10 días, realizando de 3 a 5 aplicaciones seguidas.
Maíz y arroz	Realizar aplicación foliar de 0,5 - 0,70L/ha, siguiendo la calibración del equipo. Realizar de 3 a 5 aplicaciones seguidas con un intervalo de aplicación de 10 a 14 días, se recomienda realizar la primera aplicación cuando la planta tenga 2-6 hojas.

Se recomienda utilizar el producto antes y durante la exposición de las plantas a diversas condiciones de estrés. Se recomienda realizar aplicaciones del producto en bloque repitiendo las aplicaciones en intervalos siguiendo las recomendaciones de cada cultivo. No exceda la dosis recomendada. Se recomienda aplicar Si Absorb® SL preferiblemente por la mañana, antes del mediodía. No aplicar el producto en condiciones de alta temperatura (superiores a 30oC) y bajo la luz solar directa.